MSD
Salud Animal

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Para uso exclusivo del médico veterinario.

ÍNDICE

BRAVECTO

Bravecto®
Tableta Masticable

Ver más



Bravecto®
365

Ver más



Bravecto® Spot On

Ver más



Bravecto® 1M

Ver más



Bravecto® 1M TRIPLE

Ver más



Bravecto® Plus

Ver más



DESPARASITACIÓN EXTERNA

Scalibor®
Protector Band

Ver más



DESPARASITACIÓN INTERNA

Endal®
Plus

Ver más



BIOLÓGICOS

Nobivac® Puppy DP Plus

Ver más



Nobivac® KC

Ver más



Nobivac® Intra-Trac Oral Bb

Ver más



Nobivac® DH Parvo-C

Ver más



Nobivac® DHPPi

Ver más



Nobivac® Lepto

Ver más



Nobivac® L4

Ver más



Nobivac® RL

Ver más



Nobivac® Rabia

Ver más



Nobivac® Feline 2-FeLV

Ver más



Nobivac® Feline 1 HCP + FeLV

Ver más



Nobivac® Tricat Trio

Ver más



Quantum® DA2PPv + Cv

Ver más



Quantum® DA2PPvL + Cv

Ver más



Quantum® DA2PPvL

Ver más



Quantum® DAPPv + L4

Ver más



GARANTÍA MSD

Ver más

GARANTÍA
MSD Salud Animal
Nobivac® Quantum®

PROTECCIÓN 360°

Jeringas Nobivac®

Ver más



Chiller y Cartilla Nobivac®

Ver más



TERAPÉUTICOS

Caninsulin®

Ver más



Incurin®

Ver más



Otomax®

Ver más



Posatex®

Ver más



T61®

Ver más



Salix®

Ver más



Vasotop® P

Ver más



Vivitonin®50

Ver más




MSD
Salud Animal

- **Productos a base de fluralaner aprobados por la FDA y la EMA.**
- **Se han distribuido más de 350 millones de dosis de BRAVECTO® en todo el mundo.**



Uso veterinario en perros y gatos



- **Perfil selectivo:** Bloqueo de los canales de cloro activados por los ligandos GABA y Glutamato en sistema nervioso de pulgas, garrapatas y ácaros.

- **Absorción rápida:** Se absorbe rápidamente en el torrente sanguíneo y los tejidos circundantes.

- **Distribución sistémica:** Ampliamente difundido en los fluidos del tejido cutáneo de todo el cuerpo.

- **Sin resistencia conocida:** Para confiar en una protección fiable.

- **Robusto perfil de seguridad:** Bien tolerado incluso con la dosis más alta recomendada.

Bravecto® 365

Para proteger a los perros contra pulgas y garrapatas durante todo el año.

SAGARPA Reg. Q-0273-268



Uso veterinario en perros

OFREZCA **UN AÑO COMPLETO** DE PROTECCIÓN CON UNA SOLA INYECCIÓN



La primera protección sistémica contra pulgas y garrapatas para perros con alta eficacia por todo un año.



FÓRMULA:
Fluralaner 150 mg
Excipientes c.b.p 1 ml
Apto para perros a partir de los 6 meses de de edad
Vía de administración: Inyección subcutánea

- Efectivo tratamiento contra *Demodex canis y Otodectes cynotis.*
- Reduce el riesgo de transmisión de patógenos transmitidos por vectores.
- Una nueva formulación de microcristales de fluralaner en suspensión acuosa que proporciona una protección segura y continua.
- El vial multidosis le permite extraer la dosis exacta que necesita para perros de cualquier tamaño.
- Disponible exclusivamente a través de Médicos Veterinarios.
- Resuelve los problemas relacionados con el pobre cumplimiento de los tutores de mascotas.
- Reduce la pérdida de ingresos por parasiticidas en favor de canales no veterinarios.
- Seguridad demostrada hasta 5 veces la dosis, incluso con 6 aplicaciones seguidas cada 4 meses.

Bravecto®

Protección y tratamiento contra pulgas, garrapatas y ácaros por 3 meses.

Reg. SAGARPA Q-0273-235



Uso veterinario en perros

TRES MESES DE PROTECCIÓN CONTRA PULGAS, GARRAPATAS Y ÁCAROS EN UNA SOLA TABLETA

Seguro y eficaz en perros de todas las razas, desde las 8 semanas y 2 kg de peso o mayores, adultos, hembras reproductoras, gestantes y lactantes.



3

TRES MESES
DE PROTECCIÓN
contra pulgas, garrapatas y ácaros

FÓRMULA:
Cada tableta g contiene:
Fluralaner (micronizado) 136.4 mg
Excipiente c.b.p 1 g
Apto para perros a partir de las 8 semanas de vida y más de 2 kg de peso
Via de administración: oral

Rompe el ciclo de vida de pulgas y garrapatas con una sola dosis

Tratamiento eficaz CON UNA SOLA DOSIS

1. *Demodex canis*
2. *Sarcoptes scabiei*
3. *Otodectes cynotis*

Ayuda a prevenir enfermedades transmitidas por pulgas y garrapatas :

1. *Babesia canis*
2. *Dipylidium caninum*

Bravecto® Spot On

La solución tópica más duradera para perros contra pulgas y garrapatas.

Reg. SAGARPA Q-0273-240



Uso veterinario en perros

Ideal para comedores quisquillosos, perros con alergias alimentarias y aquellos en riesgo de padecer enfermedades transitorias gastrointestinales.



3

TRES MESES
DE PROTECCIÓN
contra pulgas, garrapatas y ácaros

FÓRMULA:
Fluralaner 280 mg
Excipientes c.b.p 1 ml
Apto para perros a partir de las 8 semanas de vida y/o 2Kg de peso
Vía de administración: tópico

PROTECCIÓN PARA PERROS CON NECESIDADES ÚNICAS

- Se puede utilizar en perros y cachorros de 8 semanas de edad y un peso mínimo de 2 kg.
- Se puede utilizar como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica a las pulgas.
- Elimina pulgas y garrapatas por 3 meses.
- Elimina los ácaros: *Demodex canis, Sarcoptes scabiei y Otodectes cynotis* con un solo tratamiento.
- Prevención la transmisión de *Babesia canis* durante un período de 3 meses.
- Ayuda a prevenir la transmisión de *Dipylidium caninum.*

Bravecto® 1M

Reg. SAGARPA Q-0273-261
Reg. SAGARPA Q-0273-262
Reg. SAGARPA Q-0273-263
Reg. SAGARPA Q-0273-264



Uso veterinario en perros

La protección mensual más duradera para perros contra **pulgas, garrapatas y ácaros**



FÓRMULA:
Fluralaner (micronizado) 54.6 mg
Excipientes c.b.p 1 g
Apto para perros a partir de las 8 semanas de vida y/o 2 Kg de peso
Vía de administración: oral

37 días de efectividad contra pulgas y garrapatas

Tratamiento eficaz de *Demodex canis y Otodectes cynotis*

Protección accesible a todas las mascotas

Bravecto® 1M TRIPLE

Protege a tus pacientes por dentro y por fuera.

Reg. SAGARPA Q-0273-270
Reg. SAGARPA Q-0273-271
Reg. SAGARPA Q-0273-272
Reg. SAGARPA Q-0273-273
Reg. SAGARPA Q-0273-274
Reg. SAGARPA Q-0273-275



Uso veterinario en perros

PROTECCIÓN MENSUAL CONTRA PARÁSITOS INTERNOS Y EXTERNOS

El primer endectocida de la familia Bravecto® en un comprimido masticable, con sabor y fácil de administrar.



FÓRMULA:
Fluralaner 125.0 mg
Moxidectina 0.3125 mg
Pirantel 62.5 mg
Apto para perros a partir de las 8 semanas de vida y/o 1.27 Kg de peso
Vía de administración: oral

- Una solución fácil y cómoda para tratar y prevenir pulgas, garrapatas, ácaros *(Demodex canis, Otodectes cynotis)* y chinches besuconas.
- Seguridad demostrada en perros a partir de 8 semanas de edad y 1.27 kg de peso.
- Previene la enfermedad por gusano del corazón.
- Tratamiento contra nematodos gastrointestinales.
- Reduce el riesgo de transmisión de *Dipylidium caninum*.*
- La mezcla de sus tres compuestos permite una desparsitación externa e interna de amplio espectro.

Bravecto® Plus

Proporciona el control de parásitos que los gatos necesitan.

Reg. SAGARPA Q-0273-252

Uso veterinario en gatos



AMPLIA GAMA DE COBERTURA Y DURACIÓN EXTENDIDA

FÓRMULA:
Cada ml de solución contiene:
Fluralaner 280mg
Moxidectina 14 mg
Excipiente c.b.p. 1 ml
Apto para gatos a partir de las 9 semanas de vida y más de 1.2 kg de peso
Vía de administración: tópica

PROPORCIONA:

Parásitos externos

- Pulgas
- Garrapatas
- Ácaros

Parásitos internos

- Nematodos Gastrointestinales
- Dirofilariosis

- 3 meses de protección contra pulgas y garrapatas.
- Previene la enfermedad por gusano del corazón.
- Tratamiento de *Otodectes cynotis* (ácaro del oído).
- Tratamiento contra nematodos gastrointestinales.
- Frecuencia de dosificación reducida para mejorar la adherencia.

SCALIBOR® PROTECTOR BAND

Collar para perros con efecto repelente contra mosquitos, garrapatas y pulgas.

Reg. SAGARPA Q-0273-237



Uso veterinario en perros



Collar para el control de infestaciones por garrapatas y pulgas con efecto repelente contra mosquitos.

PRESENTACIÓN:
1 Collar de 65 CM

FÓRMULA:
Cada collar contiene:
Principio activo: Deltametrina



Ajusta el collar sin apretar y pasa el extremo a través de la hebilla.



Deja un espacio de dos dedos entre el collar y la piel.



Corta el exceso de collar dejando solo 5 cm.

- La deltametrina, se libera de forma constante por el contacto del collar con el pelo.
- 6 meses de protección contra Mosquitos, Flebótomos, Garrapatas y 4 meses de protección contra Pulgas.
- Resistente al agua.
- Efecto repelente mayor al 98% contra mosquitos.
- Seguro en cachorros a partir de 7 semanas de edad o mayores y en perras gestantes y en período de lactación.

Endal® Plus

Para el control de cestodos, nematodos intestinales y *Giardia*.

Reg. SAGARPA Q-0273-243

Endal Plus



Uso veterinario en perros



Desparasitante de amplio espectro eficaz contra cestodos, nematodos intestinales y *Giardia* spp., para uso en perros.

PRESENTACIÓN:
4 Tabletas de 660 mg.

FÓRMULA:
Febantel 150mg
Pamoato de Pirantel 144mg
Praziquantel 50mg

Dosis y vía de administración

Oral. 1 tableta para cada 10 Kg de peso para el tratamiento de cestodos y nematodos intestinales

1 tableta x 10 kg de peso

TABLA DE DOSIFICACIÓN

Peso del animal	Cantidad de producto
Hasta 5 kg	1/2 comprimido
De 6 a 10 kg	1 comprimido
De 11 a 20 kg	2 comprimidos
De 21 a 30 kg	3 comprimidos
De 31 kg a 40 kg	4 comprimidos

PROGRAMA DE DESPARASITACIÓN RECOMENDADO

Programa de desparasitación recomendado:

- Cachorros desde las 2 semanas hasta los 2 meses: cada 15 días
- Cachorros de 2 - 6 meses: mensual
- Adultos: cada 3 meses

3 – 5 dias consecutivos para el tratamiento de ***Giardia* spp.**

MSD
Salud Animal

BIOLÓGICOS



Nobivac®
Protección que nos une

Nobivac® Puppy DP Plus

La primera vacuna en México con una cepa recombinante de Parvo 2C.

Reg. SAGARPA B-0273-300



Uso veterinario en perros



Innovadora protección para cachorros

90% de cachorros protegidos vs Distemper y 100% de cachorros protegidos vs Parvovirus (2a, 2b y 2c) desde la primera dosis y aún en presencia de altos niveles de anticuerpos maternos.

FÓRMULA:
Cada dosis (1ml) de vacuna reconstituida contiene:
Virus vivo atenuado de de Distemper canino, cepa Onderstepoort: ≥ $10^{5.4}$TCID$_{50}$*
Virus vivo atenuado de Parvovirus canino, cepa recombinante 630a: ≥ $10^{5.1}$ TCID$_{50}$*
*Dosis infecciosa de cultivo de tejidos 50%

Protección temprana sin interferencia de anticuerpos maternos

Rápido inicio de inmunidad en **tres días**

La primera vacuna basada en la última cepa de campo **CPV-2c**

Protección temprana contra **distemper y parvovirus canino**

Nobivac® KC

Estimula la inmunidad de mucosas, ¡justo donde se requiere!

Reg. SAGARPA B-0273-119

Nobivac
Protección que nos une



Uso veterinario en perros



Protección contra *Bordetella bronchiseptica* y Parainfluenza Canina

Vacuna intranasal para la prevención del Complejo Respiratorio Infeccioso Canino ocasionado por *Bordetella bronchiseptica* y el virus parainfluenza.

FÓRMULA:
Cada dosis contiene:
Bacterina viva atenuada de Bordetella bronchiseptica, cepa B-C2 ≥ $10^{8.3}$
Virus vivo atenuado de la Parainfluenza Canina, cepa Cornell ≥ $10^{3.8}$ $TCDI_{50}$
Vehículo c.b.p. 1 dosis

- Aprobada para su uso desde las **3 semanas de edad**
- Máxima protección **en 3 días**
- Administración intranasal **0.4 ml en una sola fosa nasal**
- **Segura de usar** en hembras gestantes
- Una sola dosis brinda **1 año** de protección. Estimula inmunidad en mucosas y sistémica.

Nobivac® Intra-Trac Oral Bb

Estimula la inmunidad de mucosas, ¡justo donde se requiere!

Reg. SAGARPA B-0273-291

Nobivac
Protección que nos une



Uso veterinario en perros



Protección contra
Bordetella bronchiseptica.

Vacuna oral para la prevención del Complejo Respiratorio Infeccioso Canino ocasionado por *Bordetella bronchiseptica.*

FÓRMULA
Cada dosis contiene:
Bacterina viva atenuada de Bordetella bronchiseptica, cepa B-C2 ≥ 1 X 10^9 UFC

- Aprobada para su uso desde las **7 semanas de edad**
- Administración **vía oral**
- Sólo se requiere **una dosis** para estimular inmunidad en mucosas
- Una sola dosis brinda **1 año** de protección.
- **No interfiere** con anticuerpos maternos

Nobivac® DH Parvo-C

Vacuna para la protección de perros contra enfermedades virales esenciales

Reg. SAGARPA B-0273-058

Nobivac
Protección que nos une



Uso veterinario en perros



Protección sólida contra:

D= Distemper canino
H= Hepatitis infecciosa canina e infección respiratoria por Adenovirus tipo 2
Parvo C= Parvovirus canino (2a, 2b y 2c)

FÓRMULA
Cada dosis contiene:
Virus vivo atenuado de Distemper canino (moquillo canino), cepa Onderstepoort ≥ $10^{3.0}$ $DICT_{50}$
Virus vivo atenuado de Adenovirus canino tipo 2, cepa Manhattan, LPV3 ≥ $10^{3.0}$ $DICT_{50}$
Virus vivo atenuado de Parvovirus canino, cepa 154 ≥ $10^{7.0}$ $DICT_{50}$
Vehículo c.b.p. 1 ml

Segura de usar en hembras gestantes

Rápido inicio de la inmunidad: **7 días (D, H y P)**

Permite elaborar un esquema de vacunación **adaptado a las necesidades** de cada paciente.

Inmunidad estéril contra **Parvovirus canino**

Nobivac® DHPPi

Nobivac
Protección que nos une

Vacuna para la protección de perros contra enfermedades virales esenciales

Reg. SAGARPA B-0273-070



Uso veterinario en perros



Protección sólida contra enfermedades virales:

D= Distemper canino
H= Hepatitis infecciosa canina e Infección respiratoria por Adenovirus tipo 2
P= Parvovirus canino (2a, 2b y 2c)
Pi= Parainfluenza canina

FÓRMULA:
Cada dosis contiene:
Virus vivo atenuado del Distemper canino, cepa Onderstepoort $\geq 10^{4.0}$ $DICT_{50}$
Virus vivo atenuado del Adenovirus canino tipo 2, cepa Manhattan LPV3 $\geq 10^{4.0}$ $DICT_{50}$
Virus vivo atenuado del Parvovirus canino, cepa 154 $\geq 10^{7.0}$ $DICT_{500}$
Virus vivo atenuado de la Parainfluenza canina $\geq 10^{5.5}$ $DICT_{50}$
Vehículo c.b.p. 1 dosis

Segura de usar en hembras gestantes

Rápido inicio de la inmunidad: **7 días (D, H y P)**

Permite elaborar un esquema de vacunación **adaptado a las necesidades** de cada paciente.

Inmunidad estéril contra **Parvovirus canino**

Nobivac® Lepto

Nobivac
Protección que nos une

Alta masa antigénica para una sólida protección contra *Leptospira* canicola e icterohaemorrhagiae.

Reg. SAGARPA B-0273-054



Uso veterinario en perros



Vacuna contra Leptospirosis Canina

Bacterina inactivada bivalente desarrollada para la protección de caninos contra la leptospirosis causada por *Leptospira interrogans* serovares Canicola e Icterohaemorrhagiae y contra el desarrollo del estado de portador renal asintomático.

FÓRMULA:
Cada dosis contiene:
Cultivo inactivado de ***Leptospira interrogans***, serovariedad canicola, cepa Ca-12-000 ≥ 40 DP80 hámster (equivalente a ≥800 U/ml ELISA)
Cultivo inactivado de ***Leptospira interrogans***, serovariedad icterohaemorragiae, cepa 820K ≥ 40 DP80 hámster (equivalente a ≥ 800 U/ml ELISA)
Vehículo c.b.p. 1 dosis

Sin adyuvante
Menor posibilidad de reacciones adversas

Seguro de usar
en hembras gestantes

Protección renal
Previene el desarrollo del estado de portador renal asintomático de *Leptospira* Canicola e Icterohaemorrhagiae

Protección por un año
Puede utilizarse como diluyente de Nobivac® DHParvo-C o Nobivac® DHPPi

Menor cantidad de proteínas extrañas y mayor seguridad gracias al proceso de filtración VacciPure™

Nobivac® L4

Vacuna para la prevención de la leptospirosis ocasionada por 6 serovariedades de *Leptospira*.

Reg. SAGARPA B-0273-272

Nobivac®
Protección que nos une



Uso veterinario en perros



Bacterina tetravalente para perros que viven o visitan zonas con mayor prevalencia de leptospirosis

FÓRMULA:
Cada dosis contiene:
L. interrogans, serogrupo Canicola serovariedad Portland-vere (cepa Ca - 12-000) ≥2200 U[1]
L. interrogans, serogrupo Icterohaemorrhagiae serovariedad Copenhageni (cepa Ic - 02 - 001) ≥ 210 U[1]
L. interrogans, serogrupo Australis Serovariedad Bratislava (cepa As-05-073) ≥ 420 U[1]
L. kirschneri, serogrupo Grippotyphosa serovariedad Dadas (cepa Gr-01-05) ≥350 U[1]

1. **Unidades ELISA de masa antigénica**

Estudios realizados confirman una **duración de la inmunidad de 12 meses**

Previene la **mortalidad** y la **diseminación urinaria** de *Leptospira*

Menor cantidad de proteínas extrañas y mayor seguridad gracias al proceso de filtración VacciPure™

Puede utilizarse como diluyente de Nobivac® DHParvo-C o Nobivac® DHPPi

Protección contra:

Serogrupo Canicola
serovariedad Canicola

Serogrupo Icterohaemorrhagiae
serovariedad Copenhageni
serovariedad Icterohaemorrhagiae

Serogrupo Australis
serovariedad Bratislava

Serogrupo Grippotyphosa
serovariedad Grippotyphosa
serovariedad Bananal / Lianguang

Nobivac® RL

Vacuna contra la Rabia y la Leptospirosis.

Nobivac
Protección que nos une

Reg. SAGARPA B-0273-130



Uso veterinario en perros



Vacuna para la protección y prevención de las principales enfermedades zoonóticas

R= Rabia
L= *Leptospira* serovariedades Canicola e Icterohaemorrhagiae

FÓRMULA:
Cada dosis contiene:
Virus de la Rabia inactivado, cepa Pasteur RIV ≥ 3.0 UI
Cultivo inactivado de *Leptospira interrogans*, serovariedad canicola, cepa-12-00 ≥ 40 hámster PD80
Cultivo inactivado de *Leptospira interrogans*, serovariedad icterohaemorrhagiae, cepa 820K ≥ 40 hámster PD80
Vehículo c.b.p. 1 dosis

Previene el estado de portador renal asintomático ocasionado por *Leptospira*

Para completar el programa básico o para la revacunación anual

Puede utilizarse como diluyente de Nobivac® DHParvo-C o Nobivac® DHPPi

>3 UI de Potencia en la fracción de Rabia (Mayor a lo solicitado por la OMS)

Segura de usar en hembras gestantes

Nobivac
Protección que nos une

Nobivac® Rabia

Para la inmunización activa contra la rabia en perros, gatos y hurones.

Reg. SAGARPA B-0273-047



Uso veterinario en perros



Vacuna en suspensión acuosa de fosfato de aluminio, que contiene virus de la rabia, clonado de la cepa Pasteur.

FÓRMULA:
Cada dosis contiene:
Virus inactivo de la rabia, clonado de la cepa Pasteur RIVM, cultivado en células BHK 21 clone CT > 2.0 UI. Inactivada con BPL
Vehículo c.b.p. 1 dosis

Primera vacunación a partir de los **3 meses**

Revacunación anual
(según las autoridades locales)
Segura en hembras gestantes

Puede utilizarse como diluyente de Nobivac® DHParvo-C o Nobivac® DHPPi

Administración **IM ó SC**

Cada dosis de **Nobivac® Rabia** contiene una potencia de al menos 2 UI

Nobivac® Feline 2-FeLV

Nobivac
Protección que nos une

Para la inmunización de gatos contra Leucemia Viral Felina durante 2 años.

Reg. SAGARPA B-0273-270

Uso veterinario en gatos



Eficaz en la protección contra la infección latente y la viremia transitoria y persistente.

Vacuna para el control y prevención de la enfermedad por Leucemia Viral Felina.

FÓRMULA

Cada dosis contiene: Virus de inactivo de Leucemia Felina > 1.0 UR*
Vehículo c.b.p. 1 dosis *Unidad de referencia medida por la prueba de ELISA para la proteína “gp70”

- Vacuna inactivada con **adyuvante acuoso** que no se acumula en el tejido.
- Esquema primario: se requieren dos dosis con intervalo de **3 a 4 semanas** entre cada vacuna
- Vía de administración **Subcutánea (SC)**
- **Revacunación** con base en el riesgo del paciente
- Inicio de la vacunación **9 semanas**
- Inmunidad comprobada **por 2 años**

Nobivac®
Protección que nos une

Nobivac®Feline 1-HCP + FeLV

Es la combinación perfecta en una sola dosis.

Reg. B-0273-301

Uso veterinario en gatos

NUEVO PRODUCTO



Vacuna múltiple para la prevención de las enfermedades causadas por Herpesvirus, Calicivirus, Panleucopenia felina y Leucemia viral felina.

FÓRMULA
Cada dosis (1ml) contiene:
Virus de la Rinotraqueitis infecciosa felina (Herpesvirus) vivo atenuado (FVR), cepa 593-J ≥ $10^{4.7}$ PFU
Calicivirus felino vivo atenuado, (FCV), cepa 894-T ≥ $10^{3.1}$ PFU
Virus de la Panleucopenia felina vivo atenuado (FPL) ≥ $10^{3.0}$ FAID50
Virus inactivo de Leucemia felina, aislamiento Rickard ≥ 1.0 RP

Protección superior para los gatos y mayor tranquilidad para los propietarios
Nobivac® Feline 1- HCP + FeLV es la combinación perfecta en una sola dosis.

Favorece la inmunidad activa contra las enfermedades esenciales reduciendo los signos clínicos y la excreción viral en gatos cachorros y adultos

La duración de la inmunidad para FeLV es de dos años, para la prevención de la infección latente y las viremias transitoria y persistente

Nobivac® Tricat Trio

Nobivac
Protección que nos une

Reduce los signos clínicos y la excreción de virus provocados por infección con calicivirus felino, virus de la rinotraqueítis infecciosa felina y panleucopenia.

Reg. SAGARPA B-0273-267

Uso veterinario en gatos



Vacuna para la protección de los gatos contra enfermedades esenciales:
Calicivirus, Rinotraqueitis infecciosa y Panleucopenia.

FÓRMULA

Cada dosis contiene:
Calicivirus felino vivo atenuado, Cepa F9 ≥ $10^{4.6}$ PFU*
Virus de la rinotraqueítis felina (Herpesvirus) vivo atenuado, Cepa G2620A ≥ $10^{5.2}$ PFU*
Virus de la panleucopenia felina vivo atenuado, Cepa MW-1 ≥ $10^{4.3}$ $TCID_{50}$**
Vehículo c.b.p. 1 dosis

Vía de administración
Subcutánea (SC)

Refuerzo
en 3 a 4 semanas

Inicio de la vacunación
9 semanas

Revacunación
anual

Quantum®

Quantum DA2PPv+Cv

Vacuna para la prevención de las enfermedades virales más relevantes.

Reg SAGARPA B-0273-286



Uso veterinario en perros



Sólida y duradera protección contra:
D= Distemper canino
A2= Hepatitis infecciosa canina e Infección respiratoria por Adenovirus tipo 2
P= Parainfluenza canina
Pv= Parvovirus canino (2a, 2b y 2c)
Cv= Coronavirus entérico canino

FÓRMULA:
Cada dosis contiene: Fracción liofilizada:
Virus vivo atenuado de Distemper canino, cepa Distemperoide $10^{3.7}$ $TCID_{50}$
Virus vivo atenuado de Adenovirus tipo 2, cepa Ditchfield $10^{4.8}$ $TCID_{50}$
Virus vivo atenuado de Parainfluenza canina, cepa CPI-PR $10^{4.3}$ $TCID_{50}$
Virus vivo atenuado de Parvovirus canino, cepa SAH CPV-2b $10^{5.1}$ $TCID_{50}$
Fracción líquida:
Virus inactivado de Coronavirus 1.0 RP

Se ha demostrado su eficacia contra **todas las cepas conocidas de parvovirus canino** (CPV), incluido el CPV-2c

Eficacia comprobada contra **2 tipos de adenovirus** que causan hepatitis y enfermedades respiratorias en perros

Recomendado para su uso en perros sanos de **6 semanas de edad o más**

Se requieren por lo menos dos dosis administradas con **2 a 4 semanas de diferencia** para la inmunización primaria

Quantum®

Quantum DA2PPvL+Cv

Amplio espectro de protección contra enfermedades esenciales y zoonosis, incluye protección contra Coronavirus entérico.

Reg SAGARPA B-0273-287



Protección sólida contra:
D= Distemper canino
A2= Hepatitis infeciosa canina y enfermedad respiratoria por Adenovirus tipo 2
P= Parainfluenza canina
Pv= Parvovirus canino (2a, 2b y 2c)
L= *Leptospira* serovariedad Canicola e Icterohaemorrhagiae
Cv= Coronavirus

FÓRMULA:
Cada dosis contiene: Fracción liofilizada:
Virus vivo atenuado de Distemper canino, cepa Distemperoide $10^{3.7}$ $TCID_{50}$
Virus vivo atenuado de Adenovirus tipo 2, cepa Ditchfield $10^{4.8}$ $TCID_{50}$
Virus vivo atenuado de Parainfluenza canina, cepa CPI-PR $10^{4.3}$ $TCID_{50}$
Virus vivo atenuado de Parvovirus canino, cepa SAH CPV-2b $10^{5.1}$ $TCID_{50}$
Bacterina de *Leptospira interrogans* serovar Canicola, cepa LC-NY 0.0300 ml
Bacterina de *Leptospira interrogans* serovar Icterohaemorragiae, cepa LI11 403J 0.0220 ml
Fracción líquida:
Virus inactivado de Coronavirus 1.0 RP

Se ha demostrado su eficacia contra **todas las cepas conocidas de parvovirus canino** (CPV), incluido el CPV-2c

Eficacia comprobada contra **2 tipos de adenovirus** que causan hepatitis y enfermedades respiratorias en perros

Recomendado para su uso en perros sanos de **6 semanas de edad o más**

Se requieren por lo menos dos dosis administradas con **2 a 4 semanas de diferencia** para la inmunización primaria

Quantum®

Quantum DA2PPvL

Vacuna que proporciona prevención efectiva e inmunidad prolongada contra las enfermedades esenciales en perros.

Reg SAGARPA B-0273-288



Uso veterinario en perros



Protección sólida contra:
D= Distemper canino
A2= Hepatitis infeciosa canina y enfermedad respiratoria por Adenovirus tipo 2
P= Parainfluenza canina
Pv= Parvovirus canino (2a, 2b y 2c)
L= *Leptospira* serovariedad Canicola e Icterohaemorrhagiae

FÓRMULA:
Cada dosis contiene: Fracción liofilizada:
Virus vivo atenuado de Moquillo canino, cepa Distemperoide $10^{3.7}$ $TCID_{50}$
Virus vivo atenuado de Adenovirus tipo 2, cepa Ditchfield $10^{4.8}$ $TCID_{50}$
Virus vivo atenuado de Parainfluenza canina, cepa CPI-PR $10^{4.3}$ $TCID_{50}$
Virus vivo atenuado de Parvovirus canino, cepa SAH CPV-2b $10^{5.1}$ $TCID_{50}$
Bacterina de *Leptospira interrogans* serovar Canicola, cepa LC-NY 0.0300 ml
Bacterina de *Leptospira interrogans* serovar Icterohaemorragiae, cepa LI11 403J 0.0220 ml

Se ha demostrado su eficacia contra **todas las cepas conocidas de parvovirus canino** (CPV), incluido el CPV-2c

Eficacia comprobada contra **2 tipos de adenovirus** que causan hepatitis y enfermedades respiratorias en perros

Recomendado para su uso en perros sanos de **6 semanas de edad o más**

Se requieren por lo menos dos dosis administradas con **2 a 4 semanas de diferencia** para la inmunización primaria

Quantum®

Quantum DAPPv+L4

Vacuna para la protección integral contra enfermedades esenciales, incluyendo una sólida protección contra 4 serovariedades de *Leptospira*.

Reg SAGARPA B-0273-296



Uso veterinario en perros



Protección sólida contra:
D= Distemper canino
A2= Hepatitis infeciosa canina y enfermedad respiratoria por Adenovirus tipo 2
P= Parainfluenza canina
Pv= Parvovirus canino (2a, 2b y 2c)
L4= *Leptospira* serovariedad Canicola, Icterohaemorrhagiae, Pomona y Grippotyphosa

FÓRMULA:
Cada dosis contiene: Fracción liofilizada:
Virus vivo atenuado de Moquillo canino, cepa Distemperoide $10^{3.7}$ $TCID_{50}$
Virus vivo atenuado de Adenovirus tipo 2, cepa Ditchfield $10^{4.8}$ $TCID_{50}$
Virus vivo atenuado de Parainfluenza canina, cepa CPI-PR $10^{4.3}$ $TCID_{50}$
Virus vivo atenuado de Parvovirus canino, cepa SAH CPV-2b $10^{5.1}$ $TCID_{50}$
Bacterina de *Leptospira interrogans* serovar Canicola, cepa LC-NY ≥80 hamster PD80
Bacterina de *Leptospira interrogans* serovar Icterohaemorragiae, cepa LI11 403J ≥80 hamster PD80
Bacterina de *Leptospira interrogans* serovar Pomona ≥80 hamster PD80
Bacterina de *Leptospira kirschneri* serovar Grippotyphosa ≥80 hamster PD80

Prevención de la mortalidad causada por 4 serovariedades de *Leptospira*

Eficacia comprobada contra **2 tipos de adenovirus** que causan hepatitis y enfermedades respiratorias en perros

Recomendado para su uso en perros sanos de **8 semanas de edad o más**

Se requieren por lo menos dos dosis administradas con **2 a 4 semanas de diferencia** para la inmunización primaria

Menos proteínas extrañas y mayor seguridad gracias a la filtración VacciPure™

Jeringas Nobivac®

Nobivac
Protección que nos une

Seguridad para tus pacientes, tranquilidad para ti.
Una opción diferente para cada necesidad.



Uso veterinario
en perros y gatos



01.

Para administración de vacuna oral

Para la aplicación de Nobivac® Intra-Trac Oral Bb.

Utiliza la aguja para la extracción de la vacuna y retírala al momento de la aplicación vía oral.

Capacidad de 3 ml.

El émbolo verde indica la aplicación oral del biológico.



02.

Para administración de vacuna intranasal (con una sola aguja)

Para la aplicación de Nobivac® KC.

Utiliza la aguja para la extracción de la vacuna y retírala para su aplicación.

Utilízala en conjunto con el aplicador verde que indica su aplicación IN.*



03.

Con doble aguja

Para la aplicación de vacunas Nobivac® por vía parenteral.

Usa una aguja para extracción y preparación de una vacuna.

La segunda aguja es para la aplicación subcutánea.

Disminuye el dolor de la aplicación al usar una aguja “0 desgaste”.

Kit de jeringas de regalo

Al elegir **Nobivac®**, siempre tendrás el beneficio de contar con jeringas.

Variedad de opciones:
una aguja, dos agujas y orales.

PROTECCIÓN 360

*El adaptador verde se surte junto con el producto.

Nobivac®
Protección que nos une

Protección 360° Nobivac®

Seguridad para tus pacientes, tranquilidad para ti.
Una opción diferente para cada necesidad.



Chiller

Unidad de refrigeración diseñada para brindar una imagen profesional en tu clínica.
(Uso exclusivo para productos MSD)

Almacenamiento conveniente para hasta 195 viales de vacunas. Silencioso y poco estorboso para la clínica.

Cartilla exclusiva para perro y gato

Entregamos una cartilla para dar seguimiento a los programas de medicina preventiva, facilitando un registro claro y detallado de su información esencial.



¡Que los beneficios **siempre sean más!**

MSD
Salud Animal

GARANTÍA MSD



MSD Salud Animal

GARANTÍA MSD® SALUD ANIMAL

EL RESPALDO QUE TODOS NECESITAN

Único laboratorio que cuenta con la calidad y respaldo técnico que ampara la inmunización de perros y gatos contra las enfermedades protegidas por las vacunas Nobivac® y Quantum® en México.



Óptima protección + Garantía asegurada

Compensación económica con un monto máximo de hasta $11,000 MXN (pago único) para sufragar los gastos de estudios, consultas y tratamiento derivados de procesos de vacunación en donde no se logre la inmunización de las mascotas.

Una compensación financiera (incluida en el monto máximo de $11,000 MXN) en caso de eventual fallecimiento como consecuencia en la falta de inmunización en las vacunas aplicadas en las mascotas. (No acumulable).

Si quiere contar con el respaldo de la Garantía MSD Salud Animal para vacunas, contacta al representante de ventas de MSD Salud Animal en tu zona.

MSD
Salud Animal

TERAPÉUTICOS



caninsulin®

El tratamiento integral para la diabetes.

Therapeutic Pet Care

SAGARPA Q-0273-224



Uso veterinario en perros y gatos



Insulina de acción intermedia para el control eficaz de los niveles de glucemia en perros y gatos con **diabetes mellitus.**

PRESENTACIÓN:
Caja con 10 viales de 2.5 ml
Caja con 1 vial de 10 ml

Almacenar en refrigeración y agitar vigorosamente antes de cada uso.

Cada ml contiene:

Insulina zinc porcina altamente purificada	**40 UI**
Vehículo c.b.p	**1 ml**

30% de insulina-zinc amorfa

y 70% de insulina-zinc cristalina

Administración vía subcutánea.

- **Perros:** iniciar con 0.5 UI/Kg cada 24 horas
- **Gatos:** 1 a 2 UI por animal cada 12 hrs.

Peso	Dosis inicial por perro
5 kg	2.5 U.I. una vez al día
10 kg	5 U.I. una vez al día
15 kg	7.5 U.I. una vez al día
20 kg	10 U.I. una vez al día

En pacientes que no se controlen con una dosis cada 24 horas, pasar a un esquema de cada 12 horas, reduciendo la dosificación un 25%

Concentración de glucosa en sangre	Dosis inicial por gato
<360 mg/dl	1 U.I. dos veces al día
>360 mg/dl	2 U.I. dos veces al día

***No usar en pacientes con cuerpos cetónicos.**

Therapeutic Pet Care

caninsulin®

El tratamiento integral para la diabetes.

SAGARPA Q-0273-224



Uso veterinario en perros y gatos



Insulina de acción intermedia para el control eficaz de los niveles de glucemia en perros y gatos con **diabetes mellitus.**

PRESENTACIÓN:
Caja con 10 viales de 2.5 ml
Caja con 1 vial de 10 ml

Almacenar en refrigeración y agitar vigorosamente antes de cada uso.

Beneficios

- Caninsulin® Insulina de origen porcino, estructuralmente más similar a la insulina canina.
- Eficaz en perros y gatos
- Reduce los signos clínicos de diabetes en pocos días
- Dosificación más precisa debido a su concentración de 40 UI/ml

Rápido efecto y larga duración













Therapeutic
Pet Care

caninsulin®

El tratamiento integral para la diabetes.

SAGARPA Q-0273-224



Uso veterinario
en perros y gatos



Insulina de acción intermedia para el control eficaz de los niveles de glucemia en perros y gatos con **diabetes mellitus.**

PRESENTACIÓN:
Caja con 10 viales de 2.5 ml
Caja con 1 vial de 10 ml

Almacenar en refrigeración y agitar vigorosamente antes de cada uso.

Tenemos el portafolio más completo en Diabetes mellitus para el diagnóstico, tratamiento y soporte al médico y al cliente.

⊕ Jeringas (40 UI/ml) específicas para Caninsulin® que facilitan su administración.

(Venta exclusiva en clínicas veterinarias)

⊕ Pet Diabetes Tracker App. Gratuita



DISPONIBLE EN Google Play

Consíguelo en el App Store

⊕ Herramientas digitales de educación:

Para tutores de mascotas:
http://www.diabetes-perros.com/
Para Médicos Veterinarios:
http://www.caninsulin-latam.com/

Glucómetro veterinario



Escanea este código para ir al manual de uso del **g-Pet Plus+.**

INCURIN®

Tratamiento para incontinencia urinaria de origen hormonal.

SAGARPA Q-0273-018

Therapeutic Pet Care



Uso veterinario en perros



Beneficios

- Una forma natural y segura de tratar la incontinencia urinaria con una sola dosis al día [I].
- Disminución de signos a las 48 horas de iniciado el tratamiento [II].
- Al ser un estrógeno natural de corta acción no se acumula después de múltiples dosis, ni genera mielosupresión [III, IV].

PRESENTACIÓN:
Caja con 30 comprimidos

Importante
Su venta requiere de receta médica cuantificada.
Para uso veterinario exclusivamente.

Cada comprimido contiene:

Estriol	**1 mg**
Excipiente c.pb.	**1 comprimido**

I. Hendriks, S and Janszen BPM (1998) Safety trial in bitches with tablets containing oestriol (Incurin®). Proceedings of the 4th FECAVA: 512.
II. Incurin™ (estriol) Tablets for Dogs [Freedom of Information Summary]. Summit, NJ: Intervet Inc.; 2011
III. Hoeijmakers M, Janszen B, Coert A, Horspool L. Pharmacokinetics of oestriol after repeated oral administration to dogs. Res Vet Sci. 2003;75(1):55–59
IV. Clark JH, Markaverich BM. The agonistic and antagonistic actions of estriol. J Steroid Biochem. 1984;20(4B):1005–1013.

INCURIN®

Tratamiento para incontinencia urinaria de origen hormonal.

SAGARPA Q-0273-018

Therapeutic Pet Care



Uso veterinario en perros

Vía de administración

- Administración oral.

Precauciones especiales

- No administrar en hembras gestantes, enteras, ni en animales menores a un año de edad.

Siga la presente tabla de recomendaciones para identificar la dosis mínima efectiva para cada paciente.

Resultados desde el segundo día de tratamiento.



OTOMAX®

Solución segura y eficaz para la Otitis externa en perros.

SAGARPA Q-0273-047

Therapeutic Pet Care



Uso veterinario en perros



Pomada para el tratamiento de otitis externa aguda y crónica en perros, asociada a levaduras y/o bacterias.

PRESENTACIÓN:
Tubo colapsable de 15 g.

Cada gramo contiene:

Sulfato de gentamicina micronizada	**3.0 mg**
Valerato de betametasona	**1.21 mg**
Clotrimazol micronizado	**10.0 mg**
Excipiente c.pb.	**1.0 mg**

*Equivalente a 1.0 mg de betametasona.

Modo de uso

- Remover costras, detritos y secreciones con soluciones apropiadas no irritantes.
- Limpiar y secar completamente el oído externo antes del tratamiento.
- Verificar que la membrana timpánica se encuentre intacta.
- Administrar la pomada por vía ótica.

TABLA DE DOSIFICACIÓN

4	Instilar 4 gotas 2 veces al día dentro del canal ótico en perros de menos de 15 kg.
8	Instilar 8 gotas 2 veces en perros de 15 kg o más.

Mantener la terapia por lo menos durante 7 días consecutivos.

POSATEX™

UNA VEZ AL DÍA DURANTE 7 DÍAS

Therapeutic Pet Care

SAGARPA Q-0273-228



Uso veterinario en perros



Gotas para el tratamiento de la Otitis externa en perros con acción antiinflamatoria, bactericida y antifúngica.

PRESENTACIÓN:
Frasco con 8,8 ml.

Conservar en el frasco y empaque original por **debajo de 25° C.**

Cada gramo contiene.

Orbifloxacina	**8.5 mg/ml**
Furoato de mometasona	**0.9 mg/ml**
Posaconazol	**0.9 mg/ml**

Modo de uso

Una vez al día por 7 días

01. LIMPIA

Limpia el canal auditivo a fondo

02. GIRA

Gira la oreja suavemente sobre la parte superior de la cabeza del perro.

03. APLICA

Administra la cantidad indicada de Posatex™ en el canal auditivo.

04. MASAJEA

Aplica un suave masaje en el oído para ayudar a distribuir el medicamento en la parte más profunda del canal auditivo.

POSATEX™

UNA VEZ AL DÍA DURANTE 7 DÍAS

Therapeutic Pet Care

SAGARPA Q-0273-228



Uso veterinario en perros

Dosis

Aplicar en el oído afectado una vez al día por 7 días

Peso	Gotas
< 2 kg	2 gotas
2-15 kg	4 gotas
≥15 kg	8 gotas

Componentes

- **FUROATO DE MOMETASONA**
  (Antiinflamatorio)
  Corticoesteroide de elevada potencia antiinflamatoria.

- **POSACONAZOL**
  (Antifúngico de amplio espectro)
  Nuevo en salud animal, especialmente eficaz frente a la *Malassezia pachydermatis.*

- **ORBIFLOXACINA**
  (Antibiótico de amplio espectro)
  Contra bacterias comúnmente aisladas en el oído del perro.

Mayor adherencia en la piel por un tiempo prolongado, justo donde se necesita gracias a la tecnología de hidrocarbono plastificado en gel con aceite mineral.

T61®

Therapeutic Pet Care

La última terapéutica.

SAGARPA Q-0273-231



Uso veterinario en perros y gatos



Solución inyectable para eutanasia.

Cada ml contiene:

Embutramida	**200 mg**
Yoduro de mebezonio	**50 mg**
Clorhidrato de tetracaína	**5 mg**

- **La embutramida** produce narcosis profunda y parálisis del tallo cerebral.
- **El yoduro de mebezonio** provoca la relajación del músculo esquelético a nivel sistémico.
- **El clorhidrato de tetracaína** evita el dolor durante la aplicación.

PRESENTACIÓN:
Frasco de 50 ml.

Importante

Su venta requiere de receta médica cuantificada.
Para uso veterinario exclusivamente.

Vía de administración

- Colócale a tu paciente un catéter con venoclisis y una solución salina fisiológica
- Administra algún preanestésico de tu elección
- Calcula la dosis correspondiente de T61® (0.3 ml/kg de peso en perros y gatos)
- Administración Intravenosa de forma lenta y continua

T61®

Therapeutic Pet Care

La última terapéutica.

SAGARPA Q-0273-231



Uso veterinario en perros y gatos



Beneficios:

- Exclusivamente diseñado para realizar eutanasia en animales, eficaz e irreversible.
- Bajo volumen de administración en perros y gatos (0.3 ml/kg).
- La mezcla de sus tres compuestos y su administración lenta, permite un procedimiento eutanásico más adecuado.
- Puede ser utilizado en otras especies que no sean destinadas al consumo y en animales de laboratorio.

PRESENTACIÓN:
Frasco de 50 ml.

Importante
Su venta requiere de receta médica cuantificada.
Para uso veterinario exclusivamente.

Para otras especies consultar la ficha técnica.

salix®

Diurético de potente acción, como primera elección.

SAGARPA Q-0273-149

Therapeutic Pet Care



Uso veterinario en perros y gatos



Beneficios

- Rápida acción que permite eliminar el líquido acumulado en terceros espacios.
- Fórmula indicada para el tratamiento de edema y congestión pulmonar, y ascitis, asociados a insuficiencia cardiaca y edema agudo no inflamatorio.

PRESENTACIÓN:
Frasco con 10 ml

Para otras especies consultar la ficha técnica.

Cada ml contiene:

Furosemida	**50.0 mg**
(Ácido 4-cloro-N-(2-Furilmetilo) -5 sulfamoil antranílico)	
Monoetanolamina	**10.2 mg**
Vehículo c.b.p.	**1 ml**

Vía de administración

- Solución inyectable vía intravenosa o subcutánea.
- La dosis es 1-2 mg/kg de peso (0.1 a 0.2 ml/5 kg de peso) administrándose cada 24, 12 u 8 horas.
- Una vez abierto el frasco, usarse antes de 28 días.

VASOTOP® P

Para el corazón, Vasotop®

SAGARPA Q-0273-022 y Q-0273-023

Therapeutic Pet Care



Uso veterinario en perros y gatos



El Ramipril es un IECA indicado para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva en perros y gatos.

PRESENTACIÓN:
Comprimidos de 1.25 mg y 2.5 mg.

Cada gramo de Vasotop® P 1.25 mg contiene:

Ramipril	**1.25 mg**
Excipiente c.b.p.	**1 comprimido**

Cada gramo de Vasotop® P 2.5 mg contiene:

Ramipril	**2.5 mg**
Excipiente c.b.p.	**1 comprimido**

Vía de administración

- Administración oral.
- Dosis única diaria de 0.125 mg de ramipril por kg. En caso de que el médico lo determine, la dosis puede aumentarse después de 2 semanas a 0.25 mg de ramipril por kg.
- Se puede usar en conjunto con Vivitonin®.

VASOTOP® P

Para el corazón, Vasotop®

SAGARPA Q-0273-022 y Q-0273-023

Therapeutic Pet Care



Uso veterinario en perros y gatos



El Ramipril es un IECA indicado para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva en perros y gatos.

PRESENTACIÓN:
Comprimidos de 1.25 mg y 2.5 mg.

Beneficios

Cardioprotección.

- **Vasodilatación periférica**.
- **Antihipertrófico**. Mejora el vaciamiento de los ventrículos.
- **Antiisquémico.** Mejora el aporte de O2 al miocardio.
- **Antiarrítmico.** Disminuye los focos de infarto.

Nefroprotección.

- Mejora la circulación sanguínea renal.
- Mejora la función renal.
- Previene y retarda cambios morfológicos degenerativos en riñón.

VIVITONIN®50

Le devuelve la vitalidad y energía a tus pacientes.

SAGARPA Q-0273-148

Therapeutic Pet Care



Uso veterinario en perros



Para el tratamiento del Síndrome de disfunción cognitiva.

Se puede usar como auxiliar en el tratamiento de problemas cardíacos, vasculares, neurológicos y de cicatrización en piel.

PRESENTACIÓN:
Caja con 60 tabletas

Cada tableta contiene:

Propentofilina	**50 mg**
Excipiente c.pb.	**1 tableta**

Dosis y vía de administración

- Administrar de 3 a 5 mg vía oral (antes del alimento) cada 12 horas mínimo por 30 días
- Puede administrarse de forma continua
- No utilizarse en hembras gestantes y en animales en reproducción

VIVITONIN®50

Le devuelve la vitalidad y energía a tus pacientes.

SAGARPA Q-0273-148

Therapeutic Pet Care



Uso veterinario en perros



Para el tratamiento del Síndrome de disfunción cognitiva.

Se puede usar como auxiliar en el tratamiento de problemas cardíacos, vasculares, neurológicos y de cicatrización en piel.

PRESENTACIÓN:
Caja con 60 tabletas

Beneficios

- **Incrementa el flujo sanguíneo hacia el cerebro hasta en un 57%**

  La propentofilina es una metilxantina con efecto vasoterapeutico, por lo que se puede usar en toda situación que requiera mejorar la irrigación sanguinea

- **Reduce el impacto negativo del estrés oxidativo y aumenta la producción del Factor de Crecimiento Nervioso (NGF), ayudando a mantener el estado de alerta y los niveles de energía**

  La propentofilina ayuda a disminuir el estrés oxidativo y retrasar los signos del envejecimiento en perros de mediana edad y geriátricos

- **Mejora su calidad de vida ya que promueve la circulación y oxigenación a nivel sistémico, cerebro, corazón y músculos**

MSD
Salud Animal

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.
Para uso exclusivo del médico veterinario.