



**GUÍA RÁPIDA
ANIMALES DE
COMPAÑÍA
2025**



www.vetoquinol.com

INNOVACIÓN Y CALIDAD; NUESTROS DISTINTIVOS.

Desde 1933, estamos orgullosos de formar parte de esta empresa familiar, que mantiene el mismo compromiso con la excelencia y la innovación que nos ha permitido desarrollar una relación de confianza con nuestros clientes. Nuestros valores fundamentales - confianza, desafío y colaboración - nos impulsan a seguir esforzándonos para cumplir nuestra misión de mejorar la salud y bienestar animal.

GAMA ANTIINFECCIOSOS

CUIDADO DE HERIDAS

Aluspray®
Cothivet®

INFECCIONES BACTERIANAS - ANTIBIÓTICOS

Clavaseptin®P
Marbocyl® P
Pen-Hista-Strep®

ÓTICOS

Oribiotic®
Oridermyl®
Aurizon®
Ear Cleansing Solution®

PHOVIA

Phovia Lámpara LED
Phovia kit geles

GAMA CARDIONEFROLOGÍA

CARDIOLOGÍA [C]

Frécardyl®
Tonarsyl®

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Azodyl™
IPAKITINE®



GAMA DOLOR

INDUCTOR DE ANESTESIA

Clorkétam®1000

CONDROPROTECTOR

Flexadin®

INMUNOMODULADOR ARTICULAR

Flexadin
Advanced
Original

MANEJO DEL DOLOR

Cimalgex

Vétacortyl®

TRANQUILIZANTES

Calmivet®Comprimidos

Calmivet®Inyectable

GAMA COMPORTAMIENTO

Zylkene®

GAMA OTROS

CONTROL DE LA DIARREA

Prifinial®

Prifinial®gatos y perros chicos

Prifinial®solución

PROTECCIÓN DEL HÍGADO

Ornipural®

EUTRÓFICO MUSCULAR

Kynoselen®

VITAMINAS & MINERALES

Théracalcium®

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Nutri-Cal®

REMEDIO NATURAL PARA LA ELIMINACIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS BOLAS DE PELO POR ACICALAMIENTO

Laxatone® Sabor Atún

Laxatone® Sabor Maple

GAMA ANTIINFECCIOSOS

CUIDADO DE HERIDAS



Aluspray®

Uso en:

Protector y cicatrizante de heridas **VÍA TÓPICA**
Aluminio micronizado

- ✓ Protege la herida
- ✓ Favorece la cicatrización
- ✓ Reduce el riesgo de infección

Modo de Empleo:

Limpiar la herida. Colocar la válvula hacia el frente y aplicar una capa delgada cubriendo completamente la herida.

Número de Registro Q-7090-056



Cothivet®

Uso en:

Cicatrizante y antiséptico tópico **VÍA TÓPICA**
Tinturas de hidrocotilo, de castaña de la India, de alfalfa y de carlina. Aceites de lavanda, romero, tomillo y ciprés

- ✓ Recomendado para heridas de cualquier origen
- ✓ Acción antiséptica
- ✓ Poder cicatrizante potente y rápido

Modo de Empleo:

Aplicar 3 a 4 veces al día hasta que cicatrice la herida.

Número de Registro Q-7090-039

Presentación:

Aluminio micronizado presurizado. Aerosol con 210 mL.

Prescripción:

Protección de heridas (evita contaminación por microorganismos, insectos, suciedad, entre otros). Auxiliar en la cicatrización evitando formación de tejido queloide.

Presentaciones:

Solución tópica. Frascos con atomizadores con 30 y 100 mL.

Prescripción:

Para cicatrización y antisepsia de heridas de cualquier origen en las que se desea la regeneración de piel y pelo, por ejemplo: mordidas, traumatismos, quemaduras, llagas y automutilación por lamido. Auxiliar en infecciones cutáneas localizadas.

INFECCIONES BACTERIANAS - ANTIBIÓTICOS



Clavaseptin® P

Uso en:

Antibiótico oral de amplio espectro **VÍA ORAL**
Amoxicilina con ácido clavulánico

- ✓ Antibiótico de primera elección
- ✓ Acción rápida
- ✓ Muy palatable, saborizantes naturales.

Dosis sugerida:

10 mg de amoxicilina y 2.5 mg de ácido clavulánico/ kg/ 12h.

Clavaseptin® P 50 mg: 1 comp./ 4 kg/ 12 h.

Clavaseptin® P 250 mg: 1 comp./ 20 kg/ 12 h.

Clavaseptin® P 500 mg: 1 comp./ 40 kg/ 12 h.

Número de Registro Q-7090-109

Número de Registro Q-7090-110

Número de Registro Q-7090-111

Presentaciones:

Comprimidos divisibles y palatables. Caja con 100 comprimidos (10 blísteres con 10 comprimidos cada uno).

Prescripciones:

Tratamiento de infecciones cutáneas, enfermedad periodontal y limpieza dental. La combinación amoxicilina + ácido clavulánico también puede ser utilizada en casos de infecciones respiratorias, gastrointestinales y del tracto urinario.



Marbocyl® P

Uso en:

Antibiótico oral de amplio espectro **VÍA ORAL**
Marbofloxacina

- ✓ Palatable
- ✓ Tres presentaciones
- ✓ Amplio espectro (Bacterias Gram negativas y Micoplasmas)

Dosis sugerida:

2 mg./ kg/ 24 h.

Marbocyl® P 5 mg: 1 comp./ 2.5 kg/ 24 h.

Marbocyl® P 20 mg: 1 comp./ 10 kg/ 24 h.

Marbocyl® P 80 mg: 1 comp./ 40 kg/ 24 h.

Número de Registro Q-7090-116

Número de Registro Q-7090-117

Número de Registro Q-7090-118

Presentaciones:

Marbocyl® P 5 mg y Marbocyl® P 20 mg: caja con 100 comprimidos divisibles y palatables (10 blísteres con 10 comprimidos cada uno).
Marbocyl® P 80 mg: caja con 72 comprimidos divisibles y palatables. (12 blísteres con 6 comprimidos cada uno).

Prescripciones:

Indicado en el tratamiento de infecciones de la piel, tejidos blandos, tracto urinario superior e inferior asociadas o no a prostatitis o epididimitis, e infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas susceptibles.



Pen-Hista-Strep®

Uso en:

Antibiótico inyectable de amplio espectro, **VÍA IP E IM**
antiinflamatorio, antihistamínico

Penicilina G procaínica,
dihidroestreptomicina,
dexametasona, clorfeniramina

- ✓ Para tratamiento de infecciones sistémicas
- ✓ Asociación de dos antibióticos con efecto sinérgico
- ✓ Previene reacciones alérgicas

Dosis sugerida:

Canino doméstico: 1 a 5 mL/ paciente/ día.

Felino doméstico: 0.5 a 1 mL máx./ paciente/ día.

Número de Registro Q-7090-113

Presentaciones:

Suspensión inyectable. Frasco con 100 mL. Mantener en refrigeración a una temperatura de 2 a 8 °C.

Prescripciones:

Tratamiento de infecciones sistémicas, postparto, respiratorias, urinarias, postoperatorias; así como, heridas infectadas y abscesos, entre otras.





ÓTICOS

Aurizon®

Uso en:  

Suspensión para instilación auricular con antibiótico, antimicótico y antiinflamatorio ótico **VÍA ÓTICA**

Marbofloxacina, clotrimazol, dexametasona

- ✓ Potente acción bactericida y antimicótica. (Particularmente *Malassezia pachydermatis*)
- ✓ Efectivo en otitis supurativa y ceruminosa (atravesando barrera de cerumen)
- ✓ Fácil de aplicar - Cuenta con aplicador flexible

Dosis sugerida:

Limpieza y secar el canal auditivo antes del tratamiento. Administrar 10 gotas por oído una vez al día, durante 7 a 14 días. Dar un suave masaje en la base de la oreja para distribuir el producto en todo el conducto auricular.

Presentación:

Frasco con 10 ml con una cánula flexible.

Prescripción:

Tratamiento para otitis externa que curse con infección bacteriana y/o micótica con prurito y dolor.



Número de Registro Q-7090-106

Aurizon®

El poder de una combinación poderosa.

Marbofloxacina: Antibiótico de amplio espectro de acción bactericida, eficaz sobre la otitis que cursan con *Pseudomonas*.

Clotrimazol: Antimicótico de amplio espectro particularmente contra *Malassezia pachydermatis* y

Dexametasona: potente desinflamatorio.

Resultados rápidos aplicando una sola vez al día.



Oribiotic®

Uso en:   

Antibiótico, antimicótico y antiinflamatorio, en excipiente con anestésico tópico local **VÍA ÓTICA**
Neomicina, nistatina, triamcinolona y excipiente con lidocaína

- ✓ Potente acción bactericida y antimicótica
- ✓ Presentación en gel que evita desperdicios
- ✓ Fácil de aplicar - Cuenta con aplicador flexible

Dosis sugerida:

Después de haber limpiado el conducto auditivo, introducir la cánula cuidadosamente, depositar una porción y dar un suave masaje en la base de la oreja para distribuir la pomada en el conducto, 2 a 3 veces al día durante 1 a 2 semanas.

Presentación:

Pomada ótica. Tubo con 10 g con un aplicador flexible.

Prescripción:

Tratamiento para otitis externa con infección bacteriana y/o micótica con prurito y dolor.



Oridermyl®

Uso en:   

Antiparasitario, antimicótico, antibiótico y antiinflamatorio. **VÍA ÓTICA**
Permetrina, neomicina, nistatina, acetónido de triamcinolona

- ✓ Rompe con el "ciclo vicioso" de la otitis externa
- ✓ Presentación en gel que evita desperdicios
- ✓ Fácil de aplicar - Cuenta con aplicador flexible

Dosis sugerida:

Después de haber limpiado el conducto auditivo, introducir la cánula cuidadosamente y depositar una porción en el oído afectado. Dar un suave masaje en la base de la oreja para distribuir la pomada en el conducto. Aplicar una vez al día durante 21 días.

Presentación:

Pomada ótica. Tubo con 10 g con un aplicador flexible.

Prescripción:

Tratamiento para otitis externa de origen parasitario, con infección bacteriana y/o micótica con prurito y dolor.



Cuidado de los Oídos Ear Cleansing Solution®

Limpiador y antiséptico ótico **VÍA ÓTICA**
Ácido láctico, ácido benzoico, ácido salicílico, alcohol cosmético, aloe vera

- ✓ Especialmente formulado para desodorizar, limpiar, secar y acidificar el canal auditivo
- ✓ Potente cerumenolítico
- ✓ Provee un ambiente adecuado para prevenir y ayudar en infecciones óticas externas

Modo de Empleo:

Aplicar de 5 a 10 gotas en el conducto auditivo 2 o 3 veces al día. Dar un suave masaje en la base de la oreja y permitir que la mascota sacuda la cabeza.

Presentación:

Solución ótica. Envase de plástico con 120 ml con aplicador.



PHOVIA

REPARACIÓN CUTÁNEA POR ESTIMULACIÓN LUMÍNICA

PHOVIA



VÍA TÓPICA

El sistema Phovia emplea **Energía Lumínica Fluorescente (FLE)** que acelera la curación de afecciones cutáneas crónicas, heridas agudas y crónicas en perros y gatos.

Por medio de la **Energía Lumínica Fluorescente** se estimulan los cromóforos naturales dentro de las células, especialmente en las mitocondrias y la evidencia clínica muestra que, cuando se aplica Phovia, los tiempos de reparación de la piel se reducen considerablemente comparado con los tratamientos convencionales.



PHOVIA

El sistema Phovia consta de la **Lámpara LED** que proporciona luz azul. El gel cromóforo que absorbe y re-emite **Energía Lumínica Fluorescente** policromática penetrando en múltiples capas de la piel.

Lámpara LED Phovia

Contiene:

ACCESORIOS



Dimensiones: 222mm largo, 110mm ancho, 140mm alto
Peso: 650g

Baterías: 3 Baterías: 3,7V litio

Clasificación de la corriente de la batería: 3A max

Firmware almacenado en microcontrolador integrado.

LEDs: 12 LEDs CREE Royal Blue

Área de exposición: superficie de 50cm²

Instrucciones de uso.

1. Asegurar que la lámpara ha sido limpiada y desinfectada previo al uso.
2. Verificar que el nivel de batería de la lámpara tenga suficiente carga para un periodo completo de iluminación (varios ciclos de iluminación).
3. Mantener la lámpara dirigida a la piel.
4. La distancia entre la luz de la lámpara y la piel, no debe estar por encima de los 9 cm,
5. Al finalizar el periodo de 2 minutos, la luz se apagará automáticamente. La iluminación debe ser llevada a cabo sin interrupción.

Kit de 5 geles Phovia

Contiene:



5 TARROS DE GEL VEHÍCULO

AMPOLLETAS DE GEL CROMÓFORO


MEZCLADORES

Instrucciones de uso.

1. Usar guantes.
2. Sacar el contenido de la caja de geles: una ampollita, un tarro y una espátula. Colocar el resto del material en el empaque de aluminio tipo blíster.
3. Retirar la película protectora del tarro y la punta de la ampollita.
4. Vaciar el contenido de la ampollita en el tarro.
5. Con ayuda de la espátula incluida, mezclar hasta obtener un color anaranjado uniforme.
6. Cubrir el tarro hasta el momento de la aplicación.
7. Retirar cualquier vendaje o apósito que el paciente tenga.
8. Cortar cualquier pelaje que impida el contacto directo de la piel con el gel PHOVIA™.
9. Limpiar la piel del paciente con solución salina fisiológica en caso de ser necesario. Si se usa una solución diferente para la limpieza, asegurarse de que la piel ha sido enjuagada con solución salina fisiológica al finalizar.


Prepare al paciente

1. Limpie el área a tratar con solución salina estéril.
2. Aplique el gel con la espátula que contiene el kit.
3. La capa debe ser de 2 mm aproximadamente cubriendo toda el área deseada.
4. Inicie la terapia de luz. Asegúrese que todos los presentes usen las gafas protectoras.
5. Sostenga la lámpara lo más cerca posible sin llegar a tocar la piel.
6. Presione el botón de Inicio y posteriormente la lámpara se apagará a los 2 minutos al terminar la sesión.
7. Limpie gentilmente el gel sobrante con una gasa humedecida con solución salina estéril.



PHOVIA

La fotobiomodulación usa luz artificial controlada que, según su longitud de onda, penetra a las diferentes capas de la piel:



1 LUZ AZUL

- Penetra a una profundidad de 1 mm.
- Elimina bacterias y tiene efectos antiinflamatorios.

2 LUZ VERDE

- Penetra a una profundidad de 0.5 a 2 mm.
- Estimula fibroblastos e induce el proceso de reparación.

3 LUZ AMARILLA

- Penetra a una profundidad de 1 a 2 mm.
- Reduce el enrojecimiento, la tumefacción y acelera la circulación.

4 LUZ ROJA

- Penetra a una profundidad de 1 a 6 mm.
- Acelera la circulación, reduce la inflamación e incrementa la producción de colágeno.

GAMA CARDIONEFROLOGÍA

CARDIOLOGÍA



Número de Registro Q-7090-036

Frécardyl®

Uso en:

Regulador de la frecuencia cardíaca y respiratoria (analéptico cardiorrespiratorio) inyectable
Heptaminol, diprofilina

VÍAS IP, IM E IV

- ✓ Estimula y restaura la función circulatoria y respiratoria
- ✓ Ideal para animales convalecientes o muy nerviosos
- ✓ Mejora la oxigenación del cuerpo

Dosis sugerida:

2 ml/10 kg. Se puede repetir cada 5 horas, durante 4 a 5 días de acuerdo con la evolución y condición clínica del paciente.

Presentación:

Solución inyectable.
Frasco con 50 ml.

Prescripciones:

Restablece la frecuencia cardíaca y respiratoria. Auxiliar en enfermedades respiratorias, depresión cardiovascular, estimulante respiratorio, antidepresivo cuando se usan barbitúricos.



Número de Registro Q-7090-105

Tonarsyl®

Uso en:

Analéptico metabólico cardíaco inyectable
Inosina

VÍAS IV, IM Y SC

- ✓ Componente fisiológico natural
- ✓ Seguro, no altera el ritmo cardíaco
- ✓ Auxiliar para animales de alto rendimiento

Dosis sugerida:

2.5 a 5 mg de inosina por kg por día, es decir, 1 ml por cada 5 kg de peso vivo por día durante 5 a 20 días.

Presentación:

Solución inyectable.
Frasco con 50 ml.

Prescripción:

Tónico cardíaco durante la anestesia.



Nutri-Cal®

Está de **REGRESO**

Suplemento energético y nutricional en gel

Aporte de calorías, ácidos grasos Omega 3, 6 y 9, proteínas, minerales, vitaminas A, D, E y complejo B



VÍA ORAL



www.vetoquinol.com



Pídelo con tu Médico Veterinario



ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Azodyl™

Uso en: 

Probiótico que realiza Diálisis Entérica®

VÍA ORAL

E. thermophilus (KB19), *L. acidophilus* (KB27),
B. longum (KB31)

- ✓ Reduce toxinas urémicas circulantes a través de una Diálisis Entérica natural
- ✓ Disminuye complicaciones clínicas asociadas a la reducción de la función renal
- ✓ Mejora la calidad de vida

Dosis sugerida:

< 2,3 kg / 1 cáp. por la mañana al día; 2,3 - 4,5 kg / 1 cáp. por la mañana y 1 por la tarde; > 4,5 kg / 2 cáp. por la mañana y 1 por la tarde diariamente.

Presentación:

Cápsulas orales con capa entérica. Envase plástico con 90 cápsulas. Manténgase a 4°C.

Prescripción:

Apoyo para la correcta función renal cuya administración puede ser para toda la vida del animal.



Número de Autorización A-7090-002

Azodyl™

Una formulación patentada de bacterias benéficas que puede usarse para **apoyar la salud renal** mediante la **eliminación de las toxinas urémicas** a nivel intestinal y así **mejorar la calidad de vida** del paciente.

IPAKITINE®

Uso en: 

Quelante de fosfato intestinal y reductor de toxinas urémicas

VÍA ORAL

Lactosa, carbonato de calcio, chitosán

- ✓ Formulación de origen natural
- ✓ Reduce toxinas urémicas
- ✓ Fácil de administrar
- ✓ Mejora la palatabilidad del alimento
- ✓ Regula los niveles de fósforo

Dosis sugerida:

1 g por cada 5 kg de peso vivo, mezclado con el alimento dos veces al día.

Presentaciones:

Polvo oral palatable. Envase plástico con 60g y 300 g; y cuchara dosificadora de 1 g.

Prescripciones:

Ayuda a la función renal en caso de enfermedad renal crónica en perros y gatos. Auxiliar para reducir los niveles de fosfatos intestinales



Número de Autorización A-7090-001

IPAKITINE®

Esencial para el manejo de pacientes con Enfermedad Renal Crónica. Doble acción que reduce la fosfatemia intestinal y reduce las toxinas urémicas gracias a la propiedad absorbente del chitosán. **Ayuda a mantener el funcionamiento renal y a retardar la progresión de la disfunción renal.**

Azodyl™ ayuda a controlar el Nitrógeno uréico plasmático (BUN) y la Creatinina



IPAKITINE® ayuda a mantener la función renal y reducir los niveles de fosfatos.

GAMA DOLOR

INDUCTOR DE LA ANESTESIA



Número de Registro Q-7090-099

Clorkétam® 1000

Uso en:



Anestésico general inyectable de corta duración

Ketamina, clorobutanol

- ✓ Indicado para numerosas intervenciones quirúrgicas
- ✓ El clorobutanol disminuye los efectos indeseables de la ketamina
- ✓ Amplia seguridad. Posee escasa toxicidad

Dosis sugerida:

Caninos y felinos domésticos: Vía IV 5 a 8 mg/ kg. Vía IM 10 a 20 mg/kg. Animales de laboratorio: Vía IV 10 mg/kg. Vía IM 100 a 200 mg/kg.

VÍAS IM E IV

Presentación:

Solución inyectable. Frasco con 10 ml.

Prescripción:

Anestésico general.



CONDROPROTECTOR

Flexadin®

Uso en:

Condoprotector auxiliar en el manejo de la osteoartritis con coadyuvante analgésico y antiinflamatorio

Glucosamina, condroitín sulfato, Harpagophytum procumbens y manganeso

- ✓ Fácil de administrar. Comprimidos divisibles y palatables
- ✓ Tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias
- ✓ Dos presentaciones

Dosis sugerida:

Caninos: Período inicial: hasta 10 kg: 1 comp./ día; hasta de 20 kg: 2 comp./ día; de 20 a 40 kg: 3 comp./ día; más de 40 kg: 4 comp./ día. Período de mantenimiento: Disminuir la dosis a la mitad. Felinos: Período inicial y de mantenimiento ¼ comp./ día/ paciente.

VÍA ORAL



Número de Registro Q-7090-094

Flexadin®

Fórmula integral que combina los efectos de la glucosamina, condroitina y manganeso sobre la salud articular, y el *Harpagophytum procumbens* con sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias que permiten recuperar la movilidad y el bienestar del paciente. Indicado para caninos y felinos domésticos.

Presentaciones:

Envase plástico con 30 y 90 comprimidos divisibles, masticables y palatables.

Prescripciones:

Tratamiento auxiliar en el manejo del dolor y la inflamación osteoarticular y en el mantenimiento de la integridad cartilaginosa articular. Duopack 2 envases con 30 comprimidos cada uno.

INMUNOMODULADOR ARTICULAR

Flexadin® Advanced Original

Uso en:

VÍA ORAL

Nutracéutico, condoprotector e inmunomodulador articular para el manejo de la osteoartritis

Colágeno tipo II no desnaturalizado, ácidos grasos omega 3, vitamina E

- ✓ Fácil administración. Masticables suaves en forma de premios
- ✓ Una sola dosis para todos los tamaños de perros
- ✓ Reduce la inflamación y el dolor articular
- ✓ Favorece la movilidad y la flexibilidad articular

Dosis sugerida:

Un masticable suave independientemente de la talla del perro.

Presentación:

Bolsa metálica con 60 masticables suaves.

Prescripciones:

Tratamiento auxiliar en el manejo del dolor y la inflamación osteoarticular. Mantenimiento de la integridad cartilaginosa articular. Desinflamación de la articulación mediante un proceso de tolerancia inmunológica oral.



Número de Autorización Q-7090-009



Flexadin Advanced es recomendado por la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies.

Flexadin® Advanced Original

Fórmula innovadora con Colágeno Tipo II no desnaturalizado que bajo un mecanismo de tolerancia inmunológica oral **reduce la inflamación y el dolor articular y favorece la movilidad y flexibilidad.** Una práctica dosis para todas las tallas de perros. Masticables suaves para administrar fácilmente en forma de premios

Flexadin advanced es recomendado por la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies.



AMMVEPE



La evolución del tratamiento Osteoarticular

Flexadin[®] Advanced Original

- Inmunomodulador articular

- Una sola dosis; un masticable al día, independientemente de la talla del perro

- Masticables suaves y de fácil administración que funcionan como premios



Aprovecha los beneficios del Colágeno tipo II no desnaturalizado en tus pacientes; un tipo de colágeno no desnaturalizado que desencadena una respuesta antiinflamatoria en la articulación, reduce el dolor y activa el proceso de reparación del cartilago.

Solicítalo a tu distribuidor o tu representante de ventas Vetoquinol.

Número de Autorización Q-7090-009

  @VetoquinolMX


ACHIEVE MORE TOGETHER

MANEJO DEL DOLOR



Uso en:

VÍA ORAL

Antiinflamatorio no esterooidal [AINE] de nueva generación con efecto antiedematoso y analgésico oral selectivo COX-2

Cimicoxib

- ✓ Palatable
- ✓ Selectivo de COX-2, alta tolerancia
- ✓ Indicado para el dolor osteoarticular y por intervención quirúrgica

Dosis sugerida: 2 mg/kg/ día.
Cimalgex® 30 mg: 1 comp/ 15 kg/ día.
Cimalgex® 80 mg: 1 comp/ 40 kg/ día.

Presentaciones:

30 y 80 mg, caja con 32 comprimidos divisibles, masticables y palatables.

Prescripciones:

Tratamiento del dolor e inflamación asociados a osteoartritis. Control del dolor perioperatorio debido a cirugía ortopédica o de tejidos blandos.



Número de Registro Q-7090-096
 Número de Registro Q-7090-097



Indicado para tratar el dolor y la inflamación asociados a osteoartritis o dolor perioperatorio.

El cimicoxib, es una molécula selectiva que disminuye los riesgos asociados al uso prolongado de AINE's. Comprimidos palatables y divisibles que facilitan administrar una dosis más exacta y segura.



Vétacortyl®

Uso en:

VÍAS SC, IM, SUBCONJUNTIVAL, INTRASINOVIAL, INTRARRAQUÍDEA

Corticosteroide de depósito inyectable. Antiinflamatorio, antipruriginoso, antialérgico

Acetato de metilprednisolona

- ✓ Larga duración en el organismo (3 a 4 semanas)
- ✓ Indicado para afecciones osteoarticulares, musculares y reacciones alérgicas severas
- ✓ Liberación constante

Dosis sugerida:

Caninos domésticos: 0,05 a 1 ml/paciente vía IM, 0,50 ml/paciente vía intrasinoval, 0,25 a 0,50 ml/paciente vía intrarraquídea, 0,13 a 0,50 ml/paciente vía subconjuntival. Felinos domésticos: 0,5 ml/paciente vía subcutánea.



Número de Registro Q-7090-035

Presentación:

Solución inyectable. Frasco con 5 ml.

Prescripciones:

Tratamiento de inflamaciones crónicas y condiciones alérgicas como dermatosis pruriginosa y exudativa, afecciones reumatoideas, osteoarticulares y musculares.

TRANQUILIZANTES



Número de Registro Q-7090-125

Calmivet® comprimidos

Uso en:

VÍA ORAL

Tranquilizante oral
Acepromacina

- ✓ Indicado para trastornos del comportamiento
- ✓ Captura
- ✓ Tranquilización ligera y preanestesia

Dosis sugerida:

Caninos domésticos: 1 a 2 comp./ 10 kg.
 Felinos domésticos: 1 comp./ 5 kg.

Presentación:

Caja con 40 comprimidos con capa entérica.

Prescripciones:

Tranquilización (manipulaciones, captura y contención) o en procesos clínicos (agresividad, prurito asociado a irritación cutánea, canibalismo, entre otros).



Número de Registro Q-7090-009

Calmivet® inyectable

Uso en:

VÍAS IM E IV

Tranquilizante, neuroléptico y pre-anestésico
Acepromacina

- ✓ Indicado para tranquilización ligera o sedación
- ✓ Obtención rápida del efecto de "indiferencia" y "falta de interés"
- ✓ Provee relajación nerviosa y muscular

Dosis sugerida:

* Tranquilización ligera: Vía IM o IV 0,5 ml/ 10 kg.
 * Tranquilización profunda: Vía IM o IV 1 ml/ 10 kg.

Presentación:

Solución inyectable. Frasco con 50 ml.

Prescripciones:

Tranquilización ligera, profunda o como preanestésico.

GAMA COMPORTAMIENTO



Zylkene®

Uso en:

VÍA ORAL

Suplemento alimenticio auxiliar para mantener el estado de ánimo equilibrado.
Alfa-casozepina

- ✓ Fácil administración, se puede dar la cápsula completa o abrir y mezclar el polvo con el alimento, premios o agua
- ✓ Uso para situaciones a corto y largo plazo
- ✓ Seguro y mínimo riesgo de efectos secundarios



Presentaciones:


Frascos con 30 cápsulas

Prescripciones:

Auxiliar para mantener el estado de ánimo equilibrado de la mascota, ayudando a procesos etológicos o conductuales leves ante situaciones desafiantes que pudieran generar miedo o ansiedad.

Zylkene 75 mg - Número de Autorización Q-7090-006
 Zylkene 225 mg - Número de Autorización Q-7090-007
 Zylkene 450 mg - Número de Autorización Q-7090-008

Zylkene®, con un ingrediente de origen natural que ayudará a las mascotas en situaciones desafiantes de miedo o ansiedad. Zylkene® es un complemento que se puede administrar en situaciones desafiantes de corto y largo plazo.



Para situaciones desafiantes a corto y largo plazo

Uso a corto plazo



Comenzar la administración de 5 a 7 días previos al evento desafiante. Algunos animales pueden requerir comenzar solamente 1 a 2 días antes del evento.



Fuegos pirotécnicos



Visitas al veterinario



Viajes



Tormentas



Destete

Uso a largo plazo



Administrar Zylkene® durante un mes y reevaluar a la mascota. Asociar a programas de modificación de comportamiento puede ayudar en estas situaciones.



Estar solo en casa



Mudanza




Bebé nuevo



Mascota nueva

La **alfa cazosepina** es un péptido bioactivo con propiedades relajantes que se obtiene a partir de la leche mediante una hidrólisis triptica. Presenta afinidad selectiva en los receptores GABA.

Aumenta la actividad del ácido gamma aminobutírico (GABA) que es un neurotransmisor importante en el comportamiento, la cognición y la respuesta del cuerpo frente al miedo; tiene un efecto inhibitorio y relajante.



Dosis sugerida

	Zylkene® 75 mg	Hasta 5 kg	1 cápsula al día	
		5 a 10 kg	2 cápsulas al día	
	Zylkene® 225 mg	10 a 15 kg	1 cápsula al día	
		15 a 30 kg	2 cápsulas al día	
	Zylkene® 450 mg	15 a 30 kg	1 cápsula al día	
		30 a 60 kg	2 cápsulas al día	

GAMA OTROS

CONTROL DE DIARREAS



Número de Registro Q-7090-051
Número de Registro Q-7090-052

Prifinial / Prifinial gatos y perros chicos

Uso en:

VÍA ORAL

Anticolinérgico y antiespasmódico oral para el tracto digestivo con acción antisecretora
Bromuro de prifinio

- ✓ Regula el peristaltismo y elimina el espasmo del tracto digestivo
- ✓ Evita deshidratación por su acción antisecretora
- ✓ Rápido efecto

Dosis sugerida:

Prifinial® perros (70mg): 1comp/ 15kg, cada 6 a 12 horas.
Prifinial® gatos y perros chicos (7mg): 1comp/ 1.5kg, cada 6 a 12 horas. Administrar antes de las comidas.

Presentaciones:

Prifinial: 8 comprimidos
Prifinial gatos y perros chicos: 20 comprimidos

Prescripciones:

Tratamiento sintomático y regulador del peristaltismo en afecciones digestivas espasmódicas, especialmente durante la diarrea, dolor espástico, gastritis, meteorismo y obstrucción intestinal.



Número de Registro Q-7090-126

Prifinial® Solución

Uso en:


VÍA IV, IM Y SC

Anticolinérgico y antiespasmódico inyectable para el tracto digestivo con acción antisecretora
Bromuro de prifinio

- ✓ Regula el peristaltismo y elimina el espasmo del tracto digestivo
- ✓ Evita deshidratación por su acción antisecretora
- ✓ Rápido efecto

Dosis sugerida:

Caninos domésticos: 1 ml/ 8 a 10 kg.
Felinos domésticos: 0.5 ml/ 3 kg. Repetir cada 6 a 12 h.

Presentación:

Solución inyectable.
Frasco con 50 ml.

Prescripciones:

Tratamiento sintomático de afecciones digestivas espasmódicas, especialmente durante la diarrea, dolor espástico, gastritis, meteorismo y obstrucción intestinal.

PROTECCIÓN DEL HÍGADO



Número de Registro Q-7090-087

Ornipural®

Uso en:


Hepato-protector y regulador de la aminoemia

VÍA SC, IM E IV LENTA

Betaina, arginina, ornitina, citrulina, sorbitol

- ✓ Protector hepático ideal para tratamiento de intoxicaciones, enfermedades metabólicas o infecciosas
- ✓ Protege a nivel celular y favorece el metabolismo
- ✓ Disminuye la aminoemia
- ✓ No es un tónico hepático

Dosis sugerida:

2 a 5 ml/ paciente de acuerdo con el tamaño, cronicidad y severidad de la afección del paciente. Repetir la dosis 4 a 5 veces con intervalos de 2 días o de acuerdo con la evaluación clínica del paciente.

Presentación:

Solución inyectable.
Frasco con 100 ml.

Prescripción:

Estimula la actividad hepato-digestiva durante trastornos digestivos o falla hepática.



EUTRÓFICO MUSCULAR



Kynoselen®

Uso en:

Eutrófico muscular y reconstituyente
Selenito de sodio, aspartato de magnesio y aspartato de potasio

VÍA SC, IM
E IV LENTA

- ✓ Alta biodisponibilidad; actúa en diferentes niveles metabólicos y sistémicos
- ✓ Provee estimulación celular, muscular y metabólica
- ✓ Ideal para tratar y prevenir miopatías

Dosis sugerida:

2 ml/ 10 kg. Inicial: 2 veces por semana durante 2 semanas. Mantenimiento: 1 vez por semana durante 4 semanas.

Número de Registro Q-7090-030

Presentación:

Solución inyectable.
Frasco con 100 ml.

Prescripciones:

Auxiliar en desbalance nutricional, anorexia, convalecencia, inmunodepresión y en pacientes de alto desempeño físico.

VITAMINAS & MINERALES



Théracalcium®

Uso en:

Aporte de calcio inmediato y con efecto prolongado en forma inyectable
Gluconato de calcio, glucoheptonato de calcio

VÍA SC, IM
E IV LENTA

- ✓ Asociación de sales de calcio de asimilación a corto y a mediano plazo
- ✓ Rápido aporte de calcio

Dosis sugerida:

Canino doméstico: 2 a 10 ml/ paciente.
Felino doméstico: 1 a 2 ml/ paciente.

Número de Registro Q-7090-041

Presentación:

Solución inyectable.
Frasco con 100 ml.

Prescripciones:

Prevención y tratamiento de deficiencias de calcio. Auxiliar en raquitismo, hemolactación, tetania, eclampsia, entre otros.

SUPLEMENTO ALIMENTICIO



Nutri-Cal®

Uso en:

Suplemento energético y nutricional en gel

VÍA ORAL

Proteínas, ácidos grasos omega 3 y 6, minerales, vitaminas A,D,E y complejo B

- ✓ Alto aporte de calorías
- ✓ Contiene ácidos grasos omega 3 y omega 6
- ✓ Ideal para casos de pérdida de apetito, deficiencias nutricionales, energéticas, periodos de convalecencia, desarrollo de animales jóvenes, hembras gestantes o en lactación, o para mejorar el rendimiento del animal.

Número de Autorización A-7090-004

Presentación:

Gel oral palatable.
Tubo plástico flexible con 120.5 g.
Duopack 2 tubos de 120.5g. c/u.

Modo de Empleo:

Complemento dietético: ½ a 2 cda./ 5 kg/ día.
Suplemento energético: 3 cda. / 5 kg/ día.
Nota: 1 cucharada (cda.) ≈ 5 ml.



REMEDIO NATURAL PARA ELIMINAR LAS BOLAS DE PELO POR ACICALAMIENTO

Laxatone®

Uso en:

Lubricante para eliminación y prevención de la formación de bolas de pelo

VÍA ORAL

Petrolato blanco USP (vaselina), aceite mineral ligero, jarabe de maíz, jarabe de malta y aceite de soya

- ✓ Contiene ácidos grasos omega 3 y omega 6
- ✓ Ayuda eliminar y prevenir la formación de bolas de pelo en tracto digestivo
- ✓ No es laxante

Modo de Empleo:

Colocar una pequeña cantidad de Laxatone® sobre la nariz del gato para familiarizar al paciente con el sabor del gel.

Presentación:

Gel oral palatable. Tubo plástico flexible con 120.5 g. Sabor maple y sabor atún.

Prescripción:

Para bolas de pelo: ½ a 1 cda. durante 2 a 4 días. Mantenimiento: ¼ a ½ de cda. 2 a 3 veces por semana.



Laxatone®

Lubricante intestinal para eliminar y prevenir la formación de bolas de pelo, además de brindar los beneficios de los ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9 que favorecen la recuperación de la piel y el pelaje del gato. No altera el proceso digestivo del gato.

GUÍA RÁPIDA ANIMALES DE COMPAÑÍA 2025

Para uso del Médico Veterinario

VETOQUINOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Tel: 55 5262 7540

Para mayor información:

servicioalcliente_mx@vetoquinol.com

Vetoquinol México
www.vetoquinol.mx

Vetoquinol Global:
www.vetoquinol.com

